

GREEN PLUS Cosmo
EC FERTILIZER
Bor (B), Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Garanti edilen içerik:	w/w
Suda çözünür Bor (B).....	% 3
Suda çözünür Çinko (Zn).....	% 10

Kullanım şekli ve dozu: Yapraktan uygulanır.

Elma, Armut : Hasat sonrasında, yaprak dökümünden önce 1.0 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Ayrıca tomurcuk patlaması döneminde 0.5 ile 1.0 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı 50 ile 100 l/da.

Muz : Her bir uygulamada 0.1 ile 0.2 kg/da dozunda püskürtülmeli. Mevcut besleyici madde düzeyleri düşük veya sınırda ise, 7 gün aralıklarla düzenli uygulamalar yapılması gerekebilir. su oranı 50 ile 100 l/da.

Kiraz : Hasat sonrasında, yaprak dökümünden önce 1.0 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Eğer gerekli ise, uygulamalar arasında 10 ile 14 günlük aralıklar bırakarak uygulamaları tekrarlayın. Ayrıca tomurcuk patlamasıyla çiçeklenmenin başlangıcı arasındaki dönemde 0.5 ile 1.0 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı 50-100 l/da.

Narenciye : Hasat sonrasında 1.0 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Ayrıca tomurcuk patlamasıyla çiçeklenmenin başlangıcı arasındaki dönemde 0.5 ile 1.0 kg/da dozunda uygulanmalı. Önemli not: Çiçeklenme döneminde uygulama yapmayınız. Su oranı: 50 l/da.

Üzüm : Çiçeklenme öncesinde 10-14 gün arayla 0.5 kg/da dozunda 1 ile 2 uygulama yapılmalı. Ayrıca, hasat sonrasında, yaprak dökümünden önce 1.0 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı 50-100 l/da.

Ceviz vb. (Yaprağını döken Bitkiler) : Hasat sonrasında, yaprak dökümünden önce 1.0 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Ayrıca tomurcuk patlamasıyla çiçeklenmenin başlangıcı arasındaki dönemde 0.5 ile 1.0 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı 50-100 l/da.

Fındık : Tomurcuk patlamasıyla çiçeklenmenin başlangıcı arasındaki dönemde 0.3 kg/da ile 0.5 kg/da dozunda uygulanmalı. Ayrıca hasat sonrasında, yaprak dökümünden önce 1 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı : 50 l/da.

Zeytin : Tomurcuk patlamasıyla çiçeklenmenin başlangıcı arasındaki dönemde 0.5 ile 1.0 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Su oranı : 50 l/da.

Pamuk : Çıkıştan 21 – 28 gün sonra (örneğin 4-6 yaprak döneminde) ve de ilk uygulamadan 10 – 14 gün sonra 0.3 kg/da ile 0.5 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı : 7 l/da – 20 l/da.

Şeker pancarı : 4-6 yaprak döneminde 0.3-0.5 kg/da dozda uygulayın. 10-14 gün sonra 1 ya da 2 kez uygulamayı tekrarlayın. Su uygulama oranı : 20 l/da.

Örtü Altında Yetiştirilen Bitkiler : Maksimum konsantrasyon her 100 l su için 0.3 kg dir. Su oranı: 100 l/da. Uygulama zamanları için açık alanda yetiştirilen aynı bitkiler için verilen tavsiyelere bakınız.

Çilek (Açık alanda yetiştirilen) : Yeşil tomurcuk döneminden çiçeklenme başlangıcının hemen öncesindeki döneme kadar 0.5 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Ayrıca, hasat sonrasında, yaprak yaşlanması öncesinde, 0.5 kg/da dozunda uygulanmalı. Su oranı: 20 ile 50 l/da.

Domates (Açık alanda yetiştirilen) : 4 ile 6 yapraklı dönemde 0.1 ile 0.3 kg/da dozunda uygulama yapılmalı. Uygulamaların 10 ile 14 gün arayla bir veya iki kez tekrar gerekebilir. Önemli not: Çiçeklenme döneminde uygulama yapmayınız. Su oranı: 50 l/da.

Hububat : 0.5 kg/da dozunda 2 yapraklı dönemden birinci boğum oluşumuna kadarki dönemde uygulanmalı. (Zadok'un 12 ile 31 arası gelişim dönemi). Orta şiddette eksiklik durumunda 10 ile 14 gün sonra tekrarlayınız. Su oranı: 20 l/da.

Mısır : 0.5 kg/da dozunda 4 ile 8 yapraklı dönemde uygulanmalıdır. Eğer gerekirse 2 hafta sonra tekrarlanmalıdır. Su oranı : 20 l/da.

Karışılabilirlik ;

Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

Ayrıca kullanım konusunda uzmanlarımıza danışınız

Kullanımda Güvenlik Kuralları ;

Göz ve deri temasında , ayrıca teneffüs edildiğinde tahrişe yol açabilir.

Teneffüs etmeyiniz!

Göz temasında, gözlerinizi derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz

Koruyucu elbise, eldiven , gözlük ve yüz maskesi kullanınız!

Kaza durumlarında veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal doktora danışınız (ve mümkünse bu ürünün etiketini gösteriniz).

ÇOCUKLARDAN ve GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ !

Uygun Depolama Koşulları ;

Serin ve kuru yerlerde saklayınız.

Ürünü direk güneş ışıklarına maruz bırakmayınız.

Normal şartlar altında en az 3 yıl süre ile kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama Sıcaklığı : 0 ° C / +25°C değerler arasında saklamanız tavsiye edilir.

Diğer Teknik Bilgiler ;

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.

Önerilenlerin hariçindeki kullanımlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Firmamız sorumlu değildir.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim/Son Kullanım Tarihi : Ambalaj Üzerinde yazmaktadır

Kimyevi Gübre Lisans No: 1354

NET AĞIRLIK: 0,5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-30-35-40-50 KG

Parti/Seri No. Ambalaj Üzerinde yazmaktadır

Kimyevi Gübre Tescil No :

Üretici Firma: ADAFER GÜBRE ve TARIM İLAÇLARI San. Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Kaan Köksal Cad. No 23 Sarıçam / ADANA

Tel. 0 (322) 394 33 99 - 394 36 01 Fax. 0 (322) 394 36 02

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz.

Aksiini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

